















CURSO DE INICIACIÓN A GEOGEBRA

1.- Triángulo equilátero.


- i. En la vista gráfica, desactivar los ejes y activar la cuadrícula.
- ii. Seleccionar dos puntos **A** y **B** con la herramienta .
- iii. Con la herramienta  trazar la circunferencia de centro **A** y que pasa por **B** y la de centro **B** que pasa por **A**.
- iv. Con la herramienta  calcular la intersección de las circunferencias.
- v. Con la herramienta Polígono  trazar el polígono **ABC**.

2.- Cuadrado



- i. En la vista gráfica, desactivar los ejes y activar la cuadrícula.
- ii. Seleccionar dos puntos **A** y **B** con la herramienta .
- iii. Con la herramienta  trazar la circunferencia **c** de centro **A** y que pasa por **B**.
- iv. Con la herramienta  trazar la recta **a** que pasa por **A** y **B**.
- v. Con la herramienta  trazar la recta perpendicular a **a** que pasa por **B**, **b** y la recta perpendicular a **a** que pasa por **A**, **d**.
- vi. Con la herramienta  calcula el punto **C**, intersección de **c** y **d**.
- vii. Con la herramienta  trazar la recta **e**, perpendicular a **d** que pasa por **C**.
- viii. Con la herramienta  calcula el punto **D**, intersección de **e** y **b**.
- ix. Con la herramienta  trazar el polígono **ABCD**.
- x. Medir los lados con la herramienta  y los ángulos con la herramienta .
- xi. Ocultar los objetos auxiliares para que sólo quede el cuadrado.


3.- Triángulo conocidos los tres lados.

Supongamos que queremos construir un triángulo de lados 7, 5 y 3. Realizaremos los siguientes pasos:

- i. Seleccionar un punto **A**.
- ii. En la barra de entrada escribimos: $(x(A)+7,y(A))$ y se creará el punto **B**.
- iii. Trazamos la circunferencia **c** de centro **A** y radio 5 con la herramienta .
- iv. Trazamos la circunferencia **d** de centro **B** y radio 3.
- v. Calculamos el punto **C**, intersección de las circunferencias **c** y **d**.
- vi. Dibujamos el polígono **ABC**.
- vii. Por último, ocultamos los objetos auxiliares.



4.- Triángulo conocidos los tres lados (una mejora de la versión anterior)

- i. Insertamos tres deslizadores **a**, **b** y **c** con la herramienta .
- ii. Seleccionar un punto **A**.
- iii. Con la herramienta  **Segmento de longitud fija** trazamos el segmento **d** con origen en **A** y de longitud **a**.

- iv. Trazamos la circunferencia e de centro A y radio b .
- v. Trazamos la circunferencia f de centro B y radio c .
- vi. Calculamos un punto de intersección de las circunferencias anteriores.
- vii. Construimos el polígono ABC.
- viii. Ocultamos los objetos auxiliares.
- ix. Con la herramienta  **Elige y mueve**, desplazamos los deslizadores para ver el efecto.

5.- Triángulo conocidos dos lados y el ángulo comprendido.

Supongamos que queremos construir un triángulo de lados 7 y 5 y ángulo comprendido de 52° . Realizaremos los siguientes pasos:

- i. Seleccionar un punto A .
- ii. En la barra de entrada escribimos: $(x(A)+7,y(A))$ y se creará el punto B .
- iii. Con la herramienta  **ángulo dada su amplitud** dibujamos el ángulo de 52° (pinchamos en B, luego en A e introducimos 52° en el menú emergente). Se crea además un punto B' .
- iv. Con la herramienta  Semirrecta, trazamos la semirrecta a con origen en A y que pasa por B' .
- v. Trazamos la circunferencia de centro A y radio 5.
- vi. Calculamos el punto C intersección de la circunferencia y la semirrecta.
- vii. Dibujamos el polígono ABC.
- viii. Por último, ocultamos los objetos auxiliares.

Ejercicio: Con el uso de deslizadores, mejorar la construcción anterior.




6.- Triángulo conocidos un lado y los ángulos adyacentes.

Supongamos que queremos construir un triángulo de lado 7 y ángulos adyacentes de 52° y 37° . Realizaremos los siguientes pasos:

- i. Seleccionar un punto A .
- ii. En la barra de entrada escribimos: $(x(A)+7,y(A))$ y se creará el punto B .
- iii. Dibujamos el ángulo de 52° y 37° (Ojo, uno habrá que hacerlo en sentido antihorario y el otro en sentido horario). Se crean los puntos A' y B' .
- iv. Trazamos la semirrecta a con origen en A que pasa por B' y la semirrecta b con origen en B que pasa por A' .
- v. Calculamos el punto C intersección de las semirrectas.
- vi. Dibujamos el polígono ABC.
- vii. Por último, ocultamos los objetos auxiliares.

Ejercicio: Con el uso de deslizadores, mejorar la construcción anterior.

7.- Baricentro de un triángulo.

- i. Seleccionar tres puntos **A**, **B** y **C** no alineados.
- ii. Dibujamos el polígono ABC.
- iii. Con la herramienta  Punto medio, calculamos los puntos medios de los lados del triángulo **D**, **E** y **F**.
- iv. Con la herramienta  Segmento entre dos puntos, trazamos los segmentos *d*, *e* y *f* que unen cada vértice con el punto medio del lado opuesto.
- v. Calculamos el punto **G** intersección de dos de los segmentos anteriores.
- vi. Si queremos ver que el baricentro divide a la mediana en dos segmentos, uno doble que el otro, trazamos los segmentos *g* y *h* que unen **A** y **G** y **G** y **F**. Después introducimos con la herramienta  **Texto** lo siguiente:
“ $\frac{\overline{AG}}{\overline{GF}} =$ ” + (g/h). Veremos que aunque desplacemos los vértices del triángulo, el valor del cociente se mantiene.

8.- Ortocentro de un triángulo.


- i. Seleccionar tres puntos **A**, **B** y **C** no alineados.
- ii. Dibujamos el polígono ABC.
- iii. Trazamos las rectas *d*, *e* y *f* que pasan por cada uno de los vértices y son perpendiculares a los lados opuestos.
- iv. Calculamos el punto **D** intersección de dos de las rectas anteriores. Pinchamos con el botón derecho del ratón sobre el punto **D** y seleccionamos el comando **Renombra** del menú emergente y le cambiamos el nombre a **Ortocentro**.
- v. Mover uno de los vértices para comprobar la posición del ortocentro según el tipo de triángulo.

9.- Circuncentro de un triángulo.

- i. Seleccionar tres puntos **A**, **B** y **C** no alineados.
- ii. Dibujamos el polígono ABC.
- iii. Calculamos los puntos medios **D**, **E** y **F** de los lados del triángulo.
- iv. Trazamos las rectas *d*, *e* y *f* que pasan por los puntos **D**, **E** y **F** y que son perpendiculares a los lados del triángulo.
- v. Calculamos el punto **G** intersección de dos de las rectas anteriores. Renombramos el punto a **Circuncentro**.
- vi. Mover uno de los vértices para comprobar la posición del circuncentro según el tipo de triángulo.
- vii. Trazamos la circunferencia de centro el Circuncentro y que pasa por uno de los vértices.

10.- Incentro de un triángulo.



- i. Seleccionar tres puntos **A**, **B** y **C** no alineados.
- ii. Dibujamos el polígono ABC.

- iii. Con la herramienta  **Bisectriz** trazamos las bisectrices d y e de los ángulos **B** y **C**.
- iv. Calculamos el punto **D** intersección de las dos bisectrices anteriores. Renombramos el punto a **Incentro**.
- v. Dibujamos la recta f perpendicular al lado BC que pasa por el incentro.
- vi. Calculamos el punto **E** intersección del lado BC y la recta f .
- vii. Trazamos la circunferencia de centro el Incentro y que pasa por **E**.

11.- Recta de Euler.

- i. Seleccionar tres puntos **A**, **B** y **C** no alineados.
- ii. Dibujamos el polígono ABC.
- iii. Determinamos, según hemos hecho en los ejercicios anteriores, los puntos notables del triángulo, renombrándolos adecuadamente.
- iv. Dibujamos la recta que pasa por el baricentro y el circuncentro. Se ve que también pasa por el ortocentro pero no necesariamente por el incentro.

12.- División de un segmento en partes iguales.

- i. Dibujamos un segmento a de extremos **A** y **B**.
- ii. Con origen en **A**, dibujamos una semirrecta b .
- iii. Insertamos un deslizador, c , de valor mínimo 1, valor máximo 2 y e incremento 0.5.
- iv. Con centro en **A**, trazamos la circunferencia d de radio c .
- v. Calculamos el punto **D**, intersección de la circunferencia d y la semirrecta b .
- vi. Trazamos la circunferencia e de centro **D** y radio c .
- vii. Calculamos el punto **E**, intersección de la circunferencia e y la semirrecta b .
- viii. Repetimos los pasos vi y vii tantas veces como partes iguales en que quedará dividido el segmento.
- ix. Trazamos el segmento que une el último punto sobre la semirrecta con el punto **B**.
- x. Con la herramienta  **Recta paralela** trazamos paralelas al segmento anterior que pasan por los puntos determinados sobre la semirrecta.
- xi. Calculamos los puntos de intersección de las rectas paralelas con el segmento a .
- xii. Dibujamos los segmentos que unen cada punto del segmento con el siguiente.
- xiii. Con la herramienta  **Longitud**, medimos los segmentos y comprobamos que son iguales.

Ejercicio: Representar algunos números irracionales como $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, etc...

13.- Construcción de un polígono regular.

- i. Dibujamos la circunferencia c que pasa por los puntos **A** y **B**.
- ii. Trazamos la semirrecta a con origen en **B** que pasa por **A**.
- iii. Seleccionamos un punto **C** de la circunferencia c .
- iv. Trazamos la semirrecta b con origen en **B** que pasa por **C**.
- v. Seleccionamos un punto **D** de la semirrecta b .

- vi. Dibujamos la circunferencia d con centro en D que pasa por B .
- vii. Calculamos el punto E , intersección de la circunferencia d con la semirrecta b .
- viii. Trazamos la circunferencia e con centro en E que pasa por D .
- ix. Repetimos los pasos anteriores tantas veces como lados tenga el polígono regular que queremos construir. En este caso es un heptágono. Sobre la semirrecta b obtenemos los puntos D, E, F, G, H, I y J .
- x. Calculamos el punto de corte K de la circunferencia c y la semirrecta a .
- xi. Unimos mediante un segmento el punto J con el punto K .
- xii. Trazamos paralelas al segmento anterior que pasen por los puntos determinados sobre la semirrecta b . Calculamos los puntos de corte de estas rectas paralelas con la semirrecta a . Obtenemos los puntos L, M, N, O, P y Q .
- xiii. Trazamos la circunferencia con centro en K que pasa por B y la circunferencia con centro en B que pasa por K .
- xiv. Calculamos el punto de corte de ambas circunferencias, R .
- xv. Trazamos la semirrecta f_I con origen en R que pasa por M .
- xvi. Calculamos el punto de corte S de la semirrecta f_I con la circunferencia c .
- xvii. Trazamos el segmento de extremos B y S . Este segmento es el lado del polígono regular.
- xviii. Mediante circunferencias, calculamos el resto de los vértices del polígono.
- xix. Unimos los vértices mediante la herramienta polígono.

14.- Teorema de Pitágoras.

- i. Dibujamos un punto A .
- ii. Insertamos un deslizador b con valor mínimo 1, valor máximo 10 e incremento 1
- iii. En la barra de entrada introducimos: $(x(A)+b, y(A))$. Se crea el punto B .
- iv. Dibujamos la recta que pasa por los puntos A y B .
- v. Trazamos la recta que pasa por A y que es perpendicular a la anterior.
- vi. Seleccionamos un punto C en la recta del paso v.
- vii. Dibujamos el polígono de vértices A, B y C . Cambiamos el color del objeto.
- viii. En la barra de entrada introducimos: $(x(B)+y(C), y(B))$. Se crea el punto D .
- ix. En la barra de entrada introducimos: $(x(D), y(D)+b)$. Se crea el punto E .
- x. Dibujamos el triángulo de vértices B, D y E .
- xi. En la barra de entrada introducimos: $(x(E), y(E)+y(C))$. Se crea el punto F .
- xii. En la barra de entrada introducimos: $(x(F)-b, y(F))$. Se crea el punto G .
- xiii. Dibujamos el triángulo de vértices E, F y G .
- xiv. En la barra de entrada introducimos: $(x(G)-y(C), y(G))$. Se crea el punto H .
- xv. Dibujamos el triángulo de vértices C, H y G .
- xvi. Dibujamos el cuadrado de vértices B, C, G y E . Cambiamos el color del objeto.
- xvii. Dibujamos el cuadrado de vértices A, D, F y H .
- xviii. Calculamos el área de este último cuadrado de las dos formas diferentes posibles para ver que se verifica el teorema de Pitágoras.

15.-Herramienta cuadrado.

- i. Dibujamos dos puntos **A** y **B**.
- ii. Trazamos la circunferencia **c** con centro en **A** que pasa por **B**.
- iii. Dibujamos la recta **a** que pasa por los puntos **A** y **B**.
- iv. Trazamos la recta **b** que pasa por **B** y es perpendicular a **a**.
- v. Trazamos la recta **d** que pasa por **A** y es perpendicular a **a**.
- vi. Calculamos el punto de intersección **C** de la recta **d** y de la circunferencia **c**.
- vii. Trazamos la recta **e** que pasa por **C** y es perpendicular a **d**.
- viii. Calculamos el punto de intersección **D** de las rectas **b** y **e**.
- ix. Dibujamos el cuadrado de vértices **A**, **B**, **C** y **D**.
- x. En el menú **Herramientas** seleccionamos el comando **Creación de herramienta nueva**.
- xi. En la ficha **Objetos de salida** seleccionamos **Cuadrilátero polígono1**.
- xii. En la ficha **Objetos de entrada** seleccionamos los puntos **A** y **B**.
- xiii. En la ficha **Nombre e Icono** le ponemos un nombre a la herramienta, al comando y en la ayuda escribimos: **dos puntos**. Activamos la casilla **Mostrar en la barra de herramientas**.
- xiv. Guardamos el archivo como herramienta cuadrado.

16.-Comprobación del teorema de Pitágoras.

- i. Abrimos el archivo Herramienta cuadrado.
- ii. Dibujamos dos puntos **A** y **B**.
- iii. Dibujamos la recta **d** que pasa por los puntos **A** y **B**.
- iv. Trazamos la recta **e** que pasa por **A** y que es perpendicular a **d**.
- v. Seleccionamos un punto **C** en la recta **e**.
- vi. Dibujamos el triángulo de vértices **A**, **B** y **C**. Cambiamos el color del objeto.
- vii. Con la herramienta cuadrado dibujamos los cuadrados seleccionando los puntos **A** y **B**, luego los puntos **A** y **C** y, por último, los puntos **B** y **C**.
- viii. Insertamos el texto: " $a^2 = a^2$ "
- ix. Insertamos el texto: " $b^2 + c^2 = b^2 + c^2$ "
- x. Movemos los vértices para comprobar que se mantiene la igualdad.

17.-Proporción áurea

Tratamos de dividir un segmento de una longitud cualquiera en otros dos que estén en proporción áurea. Para ello dibujamos un triángulo rectángulo cuyos catetos tengan longitud **a** y **a/2**.

- i. Dibujamos un punto **A**.
- ii. Insertamos un deslizador **a** de Valor mínimo 1, Valor máximo 10 e Incremento 1. Fijamos el valor en 7 con la herramienta **Elige y Mueve**.
- iii. En la barra de entrada escribimos $(x(A), y(A) + a)$. Ya tenemos el vértice **B**.
- iv. En la barra de entrada escribimos $(x(B) + a/2, y(B))$. Ya tenemos el vértice **C**.
- v. Dibujamos el triángulo de vértices **A**, **B** y **C** con la herramienta polígono.
- vi. Trazamos la circunferencia **d** con centro en **C** que pasa por **B**.

- vii. Hallamos el punto de corte, **D**, de la hipotenusa del triángulo **ABC** con la circunferencia **d**.
- viii. Trazamos la circunferencia **e** con centro en **A** que pasa por **D**.
- ix. Hallamos el punto de corte, **E**, del cateto **AB** con la circunferencia **e**.
- x. Los segmentos **AE** y **BE** están en proporción áurea. Para comprobarlo insertamos un texto que calcule el cociente entre ambos segmentos, en el comando **Redondeo** del menú **Opciones** seleccionamos **10 Lugares decimales** y desplazamos el deslizador para ver que el cociente no cambia.

18.-Rectángulo de oro.

A partir de la construcción anterior, vamos a construir el rectángulo áureo.

- i. Abrimos el archivo de la construcción anterior.
- ii. Trazamos la circunferencia **h** con centro en el punto **E** que pasa por **B**.
- iii. Dibujamos la recta **i** que pasa por **E** y es perpendicular el cateto **AB**.
- iv. Calculamos el punto de corte, **F**, de la circunferencia **h** y de la recta **i**.
- v. Dibujamos la recta **j** que pasa por **F** y es perpendicular a **i**.
- vi. Dibujamos la recta **k** que pasa por **A** y es perpendicular el cateto **AB**.
- vii. Calculamos el punto de corte, **G**, de las rectas **j** y **k**.
- viii. Dibujamos el rectángulo ACFG.
- ix. Insertamos un texto que nos dé el cociente entre **AE** y **AG**.
- x. Ocultamos los objetos auxiliares de la construcción.
- xi. Movemos el deslizador para comprobar que el valor del cociente se mantiene.


19.-Espiral áurea.

A partir de la construcción anterior, vamos a construir la espiral áurea.

- i. Abrimos el archivo de la construcción anterior.
- ii. Creamos un nuevo rectángulo áureo adosando un cuadrado a la derecha del rectángulo áureo ya construido. Evidentemente el lado del cuadrado coincide con el lado mayor del rectángulo.
- iii. Repetimos el proceso 7 veces siguiendo el sentido inverso de las agujas del reloj.
- iv. Por último, trazamos los arcos de circunferencia necesarios para obtener la espiral.

Ejercicio: Construir la espiral de Fibonacci.


20.-Traslaciones.

- i. En la barra de entrada escribimos: $u=(2,-6)$ y creamos el vector **u**.
- ii. Dibujamos tres puntos **A**, **B** y **C** no alineados.
- iii. Con la herramienta  **Traslada objeto por un vector**, calculamos los puntos homólogos de **A**, **B** y **C**, a saber, **A'**, **B'** y **C'**.
- iv. En el menú contextual de estos seis objetos seleccionamos **Propiedades de Objeto**. En la ficha **Básico** seleccionamos **Nombre y Valor** en la casilla **Mostrar Rótulo**.

- v. Dibujamos los segmentos AA' , BB' y CC' . En las propiedades de objeto, seleccionamos una línea discontinua en la ficha **Estilo**.
- vi. Dibujamos los triángulos ABC y $A'B'C'$.
- vii. Insertamos textos que nos den las medidas de los lados de los dos triángulos, las longitudes de los segmentos AA' , BB' y CC' y el módulo del vector u .
- viii. Medimos los ángulos de los dos triángulos, observando que se mantiene la orientación.
- ix. Observamos que las coordenadas de los puntos trasladados se obtienen sumando a las coordenadas de los puntos iniciales las coordenadas del vector u .
- x. Variamos la longitud, el sentido y el módulo del vector u .

Ejercicio: Diseñar una actividad para dos traslaciones sucesivas.

21.-Giros.

- i. Dibujamos tres puntos A , B y C no alineados. Dibujamos otro punto y lo renombramos a O .
- ii. Con la herramienta  **Ángulo dada su amplitud**, calculamos los puntos homólogos de A , B y C , a saber, A' , B' y C' . Para ello hacemos clic en A , luego en O y por último introducimos el valor del ángulo y seleccionamos el sentido de giro.
- iii. Dibujamos los segmentos AO , $A'O$, BO , $B'O$, CO y $C'O$. En las propiedades de objeto, seleccionamos una línea discontinua en la ficha **Estilo**.
- iv. Dibujamos los triángulos ABC y $A'B'C'$.
- v. Medimos los lados de los dos triángulos y las longitudes de los segmentos AO , $A'O$, BO , $B'O$, CO y $C'O$.
- vi. Medimos los ángulos de los dos triángulos, observando que se mantiene la orientación.
- vii. Variamos la posición del centro de giro O y los vértices del triángulo ABC .

Ejercicio 1: Diseñar una actividad en la que dados un triángulo y su transformado por un giro, se calcule el centro de giro.

Ejercicio 2: Diseñar una actividad para dos giros sucesivos con igual centro.

22.-Simetría Axial.

- i. Dibujamos tres puntos A , B y C no alineados.
- ii. Trazamos una recta d que pasa por dos puntos D y E , distintos de los anteriores.
- iii. Dibujamos el triángulo ABC .
- iv. Trazamos las rectas e , f y g que pasan por A , B y C respectivamente y que son perpendiculares a d .
- v. Calculamos los puntos de intersección F , G y H de las rectas e , f y g con la recta d .
- vi. Trazamos la circunferencia h con centro en F que pasa por A , la circunferencia j con centro en G que pasa por B y la circunferencia k con centro en H que pasa por C .


- vii. Calculamos los puntos de corte de dichas circunferencias con las rectas e , f y g . Los renombramos a A' , B' y C' .
- viii. Construimos el triángulo de vértices A' , B' y C' .
- ix. Medimos los lados y los ángulos de ambos triángulos. Obsérvese que la simetría mantiene la amplitud de los ángulos pero no su orientación.

Ejercicio 1: Simetrías respecto de los ejes coordenados.

Ejercicio 2: Constrúyase una composición de simetrías axiales de ejes paralelos y demuéstrese que es equivalente a una traslación de vector \vec{u} cuyo módulo es igual al doble de la distancia entre los ejes de simetría, cuya dirección es la de la perpendicular a los ejes y cuyo sentido es el que va del primer eje al segundo.

Ejercicio 3: Constrúyase una composición de simetrías axiales de ejes secantes y demuéstrese que es equivalente a un giro de centro el punto de corte de ambos ejes, ángulo igual al doble del que forman los ejes de simetría y sentido el que va del primer eje al segundo.

23.-Circunferencia

- i. Dibujamos un punto A y lo renombramos a O .
- ii. Insertamos un deslizador r de valor mínimo 1, valor máximo 10 e incremento 0.5.
- iii. En la barra de entrada escribimos: $O + (r, 0)$. Se crea el punto B .
- iv. Dibujamos la circunferencia c de centro O que pasa por B .
- v. Seleccionamos un punto P sobre la circunferencia c .
- vi. Ocultamos la circunferencia c . Ocultamos el rótulo de P .
- vii. Dibujamos el segmento de extremos O y P .
- viii. En la barra de entrada introducimos: $P' = P + (0, 0)$. Ocultamos su rótulo.
- ix. Con la herramienta  insertamos una casilla de verificación. En el menú contextual que aparece al hacer clic en la vista gráfica introducimos en el cuadro de texto **Subtítulo: Activa rastro de P** y en la lista desplegable **Selección de objetos de la construcción o de la lista** seleccionamos el punto P' .
- x. Activamos la casilla de verificación y movemos el punto P' para ver cómo se construye la circunferencia.

24.-Elipse.

- i. Dibujamos un punto A y lo renombramos a F .
- ii. Insertamos un deslizador a de valor mínimo 1, valor máximo 6 e incremento 0.5.
- iii. En la barra de entrada escribimos: $F + (2a, 0)$. Se crea el punto B . Lo renombramos a F' .
- iv. En la barra de entrada introducimos: Elipse $[F, F', 2a]$. Se crea la elipse c .
- v. Seleccionamos un punto P sobre la elipse c .
- vi. Ocultamos la elipse c . Ocultamos el rótulo de P .
- vii. En la barra de entrada introducimos: $P' = P + (0, 0)$. Ocultamos su rótulo y activamos su rastro.

- viii. Insertamos una casilla de verificación f y ponemos en el **Subtítulo: Activa rastro de P**.
- ix. Hacemos clic con el botón derecho en el punto P' (en la vista algebraica) y seleccionamos el comando **Propiedades de objeto**. En el cuadro de texto **Condición para exponer el objeto** de la pestaña **Avanzado** introducimos f y cerramos la ventana.
- x. Activamos la casilla de verificación y arrastramos el punto P . Veremos que se dibuja la elipse.
- xi. Cambiamos los valores del deslizador para dibujar diferentes elipses.

25.- Otra Elipse.

Supongamos que queremos dibujar una elipse cuyos focos son $F(2,-2)$, $F'(2,-9)$ y semieje mayor igual a 5. Procederemos del siguiente modo:

- i. Dibujamos los focos F y F' .
- ii. Trazamos el segmento a que une F y F' .
- iii. Calculamos el punto medio O del segmento a .
- iv. Trazamos la recta b perpendicular al segmento a que pasa por O .
- v. Dibujamos la circunferencia c de centro O y radio 5.
- vi. Dibujamos la recta d que pasa por los puntos F y F' .
- vii. Calculamos los puntos de corte A y A' de la recta d con la circunferencia c .
- viii. Seleccionamos un punto cualquiera H sobre el segmento a . Quizá debamos ocultar la recta d para hacer bien la selección.
- ix. Dibujamos la circunferencia e de centro F y radio la distancia de H a A y la circunferencia f de centro F' y radio la distancia de H a A' .
- x. Calculamos los puntos de corte B y C de las circunferencias e y f .
- xi. Dibujamos la elipse que tiene como focos F y F' y que pasa por B .

26.- Otra más.

- i. Insertamos dos deslizadores b y c de valor mínimo 0, valor máximo 10 e incremento 1.
- ii. En la barra de entrada introducimos $(0, b)$ (lo renombramos a B), $(0, -b)$ (lo renombramos a B'), $(-c, 0)$ (lo renombramos a F) y $(c, 0)$ (lo renombramos a F').
- iii. En la barra de entrada introducimos: $(b^2+c^2)^{0.5}$. se crea el número a .
- iv. En la barra de entrada escribimos: $(-a, 0)$ (punto A) y $(a, 0)$ (punto A').
- v. Dibujamos la elipse d de focos F y F' que pasa por A .
- vi. Seleccionamos un punto cualquiera C sobre la elipse d .
- vii. Dibujamos los segmentos e y f que unen el punto C con los focos F y F' .
- viii. Introducimos dos textos que nos den la suma de las longitudes de los segmentos e y f y la excentricidad.

27.-Hipérbola.

- i. Dibujamos dos puntos **F** y **F'**.
- ii. Trazamos la recta **a** que pasa por **F** y **F'**.
- iii. Trazamos la mediatriz **b** del segmento **FF'**.
- iv. Calculamos el punto de corte **O** de las rectas **a** y **b**.
- v. Seleccionamos un punto cualquiera **A**.
- vi. En la barra de entrada introducimos: **Hipérbola [F,F',A]**.
- vii. Seleccionamos dos puntos **P** y **Q** sobre la hipérbola **c**.
- viii. Ocultamos la hipérbola **c** y el punto **A**.
- ix. En la barra de entrada introducimos: **P'=P+(0,0)** y **Q'=Q+(0,0)**. Activamos los rastros de **P'** y **Q'** y los ocultamos.
- xii. Insertamos una casilla de verificación **d** y ponemos en el **Subtítulo: Activa rastro de P y Q**.
- x. En la pestaña Avanzado de las propiedades de **P'** y **Q'** escribimos **d**.
- xi. Arrastramos los puntos **P** y **Q** (con la casilla de verificación activada) para crear las dos ramas de la hipérbola.

28.-Parábola

- i. Dibujamos dos puntos **A** y **B** y la recta **a** que pasa por ellos. Ocultamos los rótulos de los puntos.
- ii. Dibujamos otro punto y lo renombramos a **F**.
- iii. Seleccionamos un punto cualquiera **C** sobre la recta **a**.
- iv. Trazamos la recta **b** que pasa por **C** perpendicular a **a**.
- v. Dibujamos la mediatriz **c** de los puntos **C** y **F**.
- vi. Calculamos el punto de intersección de **b** y **c**. Lo renombramos a **P**.
- vii. En la barra de entrada introducimos: **P' = P + (0, 0)**. Activamos el rastro de **P'** y lo ocultamos.
- viii. Insertamos una casilla de verificación **d** y ponemos en el **Subtítulo: Activa rastro de P**.
- ix. Trazamos los segmentos que unen **P** con **C** y **P** con **F**. Les cambiamos el color a rojo.
- x. Activar la casilla de verificación y arrastrar el punto **C**.

29.-Funciones Elementales

Vamos a representar gráficamente las funciones lineal, afín, cuadrática, valor absoluto, parte entera, raíz cuadrada, proporcionalidad inversa y una función definida a trozos.

- i. Insertamos tres deslizadores **a**, **b** y **c** de valor mínimo -5, valor máximo 5 e incremento 0,5.
- ii. Escribimos en la barra de entrada: $a x$, $a x + b$, $a x^2 + b x + c$, $\text{abs}(x)$, $\text{floor}(x)$, $\text{sqrt}(x)$, $1/x$, $\text{Si}[x \leq -1, x, \text{Si}[-1 < x < 3, -3 + x^2, 1/x]]$. Se representan las funciones definidas.

- iii. Para dar más claridad a la construcción, cambiamos el color de las funciones y les ponemos un estilo más grueso. Además, introducimos ocho casillas de verificación (una para cada función), le ponemos el subtítulo correspondiente a cada una de las funciones y en las propiedades de cada función ponemos la condición de que sea visible cuando la casilla de verificación esté activada.
- iv. Seleccionamos dos puntos cualesquiera **A** y **B** de la función afín. Trazamos una recta que pase por **A** y sea paralela al eje **OY** y una recta que pase por **B** paralela al eje **OX**. Calculamos el punto **C**, intersección de ambas rectas. Introducimos un cuadro de texto que nos de la pendiente de la recta: “pendiente=” + $((y(A)-y(C))/(x(B)-x(C)))$. En las propiedades del texto, hacemos que se haga visible sólo cuando sea visible la función afín.
- v. Calculamos las raíces, el vértice y el punto de corte con el eje vertical de la función cuadrática. Los hacemos visibles sólo cuando la función cuadrática lo sea.

EJERCICIOS

1. Dadas dos rectas r y s y un punto P , trazar por P una recta tal que sus puntos de intersección con r y s determinen un segmento cuyo punto medio sea P .

La recta r' simétrica de r respecto a P , corta a s en un punto A que es uno de los vértices buscados.

2. Construir un triángulo equilátero cuyos vértices A , B y C estén situados, respectivamente, en las rectas r , s y t que son paralelas entre sí.

Elegido un punto A de r como vértice del triángulo, se aplica a la recta s un giro de centro A y ángulo 60° . La recta s' obtenida corta a t en el punto C que será otro vértice.

3. Construir un cuadrado que tenga un vértice en un punto dado O y los dos contiguos A y B en la recta r el primero de ellos y en la recta s el segundo suponiendo que estas rectas no pasan por O .

Aplíquese a la recta r un giro de centro O y ángulo 90° . La recta r' obtenida corta a s en el vértice B .

4. Dados en un plano dos puntos M y N y dos rectas r y r' , construir un paralelogramo $MNPQ$ de forma que los vértices estén cada uno en una de las rectas dadas.

Aplíquese a la recta r la traslación de vector MN . Su transformada corta a r' en un punto P que será otro de los vértices del paralelogramo.

5. Dadas en el plano dos circunferencias de centros O y O' respectivamente, encontrar un punto A de la primera y un punto B de la segunda de manera que el segmento AB tenga longitud y dirección iguales a las de un vector dado.

Aplíquese a una de las circunferencias una traslación definida por el vector de módulo, dirección y sentido iguales a los del vector dado. La circunferencia obtenida corta a la de centro O' en dos puntos (en general) que serán los extremos B de las posibles soluciones.

6. Dados dos puntos A y B a un mismo lado de una recta dada r , hallar el punto C de r de forma que la suma de los segmentos AC y CB sea mínima.

Hallando el simétrico B' de B respecto de r , la recta AB' corta a r en el punto C buscado.

7. Dado un triángulo ABC dibujar un cuadrado de vértices $MNPQ$ de forma que los vértices M y N estén sobre el lado BC , el vértice P sobre el lado AC y el vértice Q sobre el lado AB .

Constrúyase, en el exterior del triángulo, el cuadrado $BRSC$. La recta AR corta al lado BC en el vértice M del cuadrado y la homotecia de centro A y razón $k = \frac{\overline{AM}}{\overline{AR}}$ transforma el cuadrado en el buscado.

- 8 Los focos de una elipse son $F(-1,1)$, $F'(5,3)$ y su semieje mayor mide 4 unidades. Determina el resto de elementos de la elipse.