Primeros Auxilios

22-03-2021

16-18 horas

Fco. Javier Rosa Morán

Primeros Auxilios

22-03-2021

HERIDAS

QUEMADURAS

DESVANECIMIENTO

HEMORRAGIA NASAL

GOLPE EN LA CABEZA

CUERPOS EXTRAÑOS

ESGUINCES

FRACTURA DE HUESOS

ATRAGANTAMIENTO

Fco. Javier Rosa Morán

Fco. Javier Rosa Morán

Recursos para
Primeros Auxilios

Máxima: niños no son adultos en pequeño

Fco. Javier Rosa Morán

HEMORRAGIAS

Fco. Javier Rosa Morán

CLASES

Los sangrados venosos y capilares son + comunes

GRAVEDAD

PRIMEROS AUXILIOS

Empaquetado

Apósito hemostático

Torniquete

Niños < 6 años no comprimir la nariz porque son respiradores nasales. Aplicar frío

HEMORRAGIAS EXTERIORIZADAS

Fco. Javier Rosa Morán

POSICIÓN
CABEZA

SI

NO

HIELO o
COMPRESAS
FRÍAS SOBRE
EL PUENTE

NO EJERCICIOS
BRUSCOS NI
SONARSE HORAS
DESPUÉS

NO

POSICIÓN CUERPO

NO

PRESIÓN
NARIZ

RESPIRAR
POR BOCA

+ DE 20
MINUTOS
ACUDIR A
URGENCIAS

NO

EPISTAXIS

OVACE: identificación

Fco. Javier Rosa Morán

Fco. Javier Rosa Morán

OVACE LEVE
actuación adultos

- Adherencia: jamón
- Enclavamiento: espina
- Misil: fruto seco
- Tapón: salchicha

- Consistencia
- Estado físico
- Forma
- Tamaño

Fco. Javier Rosa Morán

OVACE GRAVE
actuación adultos

Fco. Javier Rosa Morán

OVACE GRAVE
actuación adultos

OVACE EN ADULTOS INCONSCIENTES: actuación

Fco. Javier Rosa Morán

CASOS ESPECIALES DE OVACE

Fco. Javier Rosa Morán

¿

?

Fco. Javier Rosa Morán

**CASOS
ESPECIALES DE OVACE**

< 5 AÑOS:
NO UVAS NI
FRUTOS SECOS

Fco. Javier Rosa Morán

OVACE LEVE
EN NIÑOS

OVACE GRAVE EN NIÑOS

Fco. Javier Rosa Morán

OVACE GRAVE EN LACTANTES

Fco. Javier Rosa Morán

HERIDAS

Lesiones de piel las + frecuentes en niños

La herida que se vaya a cerrar tratarla antes de 6h. Después de este tiempo no suturar por riesgo de infección.

Fco. Javier Rosa Morán

Protocolo OMS

0 Humedezca sus manos con abundante agua.	1 Enjabone sus manos con el grifo cerrado	2 Comenzar frotando las palmas de las manos
3 Intercale los dedos y frote por la palma y el anverso de la mano	4 Continúe con los dedos intercalados y limpie los espacios entre si.	5 Con las manos de frente agárse los dedos y mueva de lado a lado.
6 Tome el dedo "gordito" como en la figura para limpiar la zona del agarre de la mano.	7 Limpie las yemas de los dedos, frotando contra la palma de la mano	8 Enjuague sus manos con abundante agua (8 seg. aprox.)
9 Seque las manos con una toalla desechable o con aire caliente.	10 Cierre el grifo con una toalla desechable	11 Ya está!

HERIDAS

REGLAS DEL VENDAJE

Fco. Javier Rosa Morán

1. NI MUY APRETADO NI MUY FLOJO.
2. GLOBO HACIA ARRIBA.
3. EMPEZAR EN OBLICUO Y METER PICO EN 2ª VUELTA.
4. DISTAL A PROXIMAL.
5. DESENROLLAR LO JUSTO.
6. NO CUBRIR DEDOS.
7. NO DEJAR CABOS SUELTOS QUE PUEDEN ENGANCHARSE.
8. FINALIZACIÓN:
  - CON LA PROPIA VENDA
  - CON LA PROPIA VENDA EN COLA DE RATÓN
  - CON LA PROPIA VENDA CON ESPARADRAPO
  - CON EL CLIP DE LA VENDA.

ESGUINCE

LUXACIÓN

- Rubor
- Calor
- Tumor
- Dolor
- Impotencia funcional

-itis

SEPARACIÓN MOMENTANEA

Reposo

hlelo

Compresión

Elevación

¡Me dijiste que querías tener hijos!

¡Lo decías tú!

En Fx de escápula o clavícula:
"hombro caído" o derribado"

En luxación de hombro:
"hombro en charretera"

SEPARACIÓN PERMANENTE

FRACTURAS

Fco. Javier Rosa Morán

QUEMADURAS

I

II

III

IV

QUEMADURAS

Signos de inhalación: vibras quemadas - expectoración negruzca - afonía o ronquera

QUEMADURAS

1º ENFRIAR

2º TAPAR

Solución antishock: pequeños sorbos de agua + sal + bicarbonato + zumo limón

LO QUE NO HACER EN LAS QUEMADURAS

NO poner HIELO

No despegar

la ropa adherida a la piel

LAVAR

con abundante agua la zona

No aplicar POMADAS ni PASTA DENTAL

Nunca reventar AMPOLLAS, ya que contienen plasma que protege de las infecciones!

TAPAR la zona con un PAÑO ESTÉRIL humedecido o con vaselina

PÉRDIDA DE CONSCIENCIA

- ❑ **CONSCIENCIA:** capacidad de mantenernos alerta. Nos permite percibir los estímulos que nos rodean y elaborar respuestas adecuadas.
- ❖ **Síncope**= desmayo. **Síncope vasovagal**= desmayo común o lipotimia
- ❑ **REGLA DE LA ORIENTACIÓN x4:** Temporal- Espacial- Personal- Situacional.
- ❑ **EXPLICACIÓN:** SN Autónomo desencadena un reflejo que enlentece el pulso y ↓ TA. Presente en todos pero en algunas personas + exagerado.
- ❑ **SÍNTOMAS**
  - ❖ Pérdida de conocimiento precedida de mareo.
  - ❖ Puede: náuseas, palidez, sudoración, incluso alteraciones visuales y auditivas,..
- ❑ **CAUSAS**
  - ❖ Lugares cerrados o calurosos. Inmóvil durante tiempo prolongado. Estrés emocional. Observar sangre...

ENTIDADES CLÍNICAS PERTURBADORAS DE LA CONSCIENCIA

1- PRESÍNCOPE o LIPOTIMIA: sensación inminente de pérdida de consciencia. Pérdida transitoria, breve y superficial de la consciencia.

✓ **Signos premonitorios:** debilidad + mareo + triada + visión borrosa.

2- SÍNCOPE: progresión en el tiempo del estado anterior.

Hay enfermedades graves que pueden dar síncope, pero son + frecuentes los producidos por estímulos: calor-dolor-emociones intensas (**S. vasovagal**)

Ambos episodios se resuelven en pocos minutos si no hay causa subyacente.

Javier Rosa

PRIMEROS AUXILIOS ANTE PRESÍNCOPE

- Actuar precozmente ante los signos anunciadores: **sentarse** o **tumbarse** (piernas elevadas). Si no: **en cuclillas** o **sentado** con la cabeza baja. Mantener **visión fija** en un lugar lejano (en lugar de cerrar los ojos). Así hasta que desaparezcan los síntomas. Levantarse con cuidado.
- Evitar “**circo mediático**”: aglomeraciones, el del abanico, el del agua, ...
- Aflojarle **prendas**.
- **Tranquilizar**.
- Si **hiperventila**: elimina mucho CO₂, PH de la sangre sube y esto da alteraciones; se queda rígida (“manos en comadrón”)

PRIMEROS AUXILIOS ANTE PRESÍNCOPE

- Ante síncope (paciente inconsciente que respira): **PLS** y avisar al **112**

MANIOBRAS FÍSICAS DE CONTRAPRESIÓN (MFC)

Contracciones isométricas musculares que **comprimen el sistema venoso** evitando el acúmulo de sangre en éste y **↑ el retorno venoso**. Además, **aumenta el tono simpático** que incrementa la FC. Todo ello **aumenta la PA** que corta el síncope o lo pospone.

- **Sentarse con la cabeza baja** entre las rodillas (recomendación tradicional), pero que al igual que estar en **decúbito** es una maniobra llamativa que puede ser difícil en espacios públicos.
- **Cruzar piernas** o **tensionar músculos de las piernas** aumenta el retorno venoso y activa el sistema simpático.
- **Cruzar manos y tensar brazos** en la fase prodrómica del síncope reflejo.
- **Contraer la musculatura abdominal**, inclinarse **hacia delante**, flexionar las rodillas o **ponerse en cuclillas** son otras maniobras.

Cruzar las manos
y
tensar los brazos

Cruzar y tensionar
las
piernas

Elevar un pie en
un escalón o en
una silla

Ponerse
en
cuclillas

SÍNCOPE VASOVAGAL

CUERPO EXTRAÑO EN OJO

- ❑ Cualquier partícula puede dar **síntomas irritativos**: picor-dolor-escozor-fotofobia-lagrimo-ojo rojo, ...
- ❑ **Actitud**: tranquilizar y evitar que se frote.
- ❑ **Actuación**: explorar el ojo.
  - 1º **evertir** párpado inferior buscando el ce. Si se ve: extraer con punta de una gasa o pañuelo, o lavar con una jeringuilla con suero.
  - 2º **evertir** párpado superior con nuestros dedos o con un bastoncillo de oídos, sujetando el párpado por las pestañas (truco: que dirija la mirada hacia los pies).
  - Si **lentes de contacto** quitárselas (hay que saber).
  - Si **está enclavado**: no extraerlo, tapar con un parche hecho con gasas.

CUERPOS
EXTRAÑOS
EN EL
OJO

Ojo afecto
en la
parte
inferior

Javier Rosa

Doblar el aplicador de punta de algodón hacia arriba

Mirar hacia abajo

Javier Rosa

ACTUACIÓN ANTE INGESTIÓN QUÍMICA

Frecuentes a **última hora de tarde** (padres fatigados y muy atareados todavía).
Fines de semana cuando se ocupa el padre de ellos. Vacaciones. Fiestas.

Fco. Javier Rosa Morán

PERMEABILIDAD DE LA VÍA AEREA

- ❖ POSICIONARLE oportunamente
- ❖ ACOMPAÑARLE: herramientas comunicativas (regla las 3 “P”: Paráfrasis-Paralingüística- Proxémica).
- ❖ TRANQUILIZARLE: contacto visual, físico y posición.
- ❖ TAPARLE: cuidado con la hipotermia

MÉTODO DE ESPERA A LA AMBULANCIA

PRÁCTICAS

1. Tiras de TELA para vendajes compresivos.
2. TORNQUETE COMERCIAL.
3. VENDAS CREPÉS para vendar:
  - Brazo (espiga).
  - Muñeca
  - Capelina
4. Tiras de ESPARADRAPO para vendollette
5. PAÑUELO TRIANGULAR: para cubrir:
  - Mano
  - Pie
  - Cabeza.
6. Prácticas de OVACE

MATERIAL DE PRÁCTICAS

Fco. Javier Rosa Morán