

Perdidas de conciencia

Un síncope es una pérdida brusca y breve de la conciencia y del tono muscular debido a la disminución del riego cerebral y que se recupera de forma espontánea, rápida, completa y sin secuelas.

Tipos de pérdida de conciencia:

- Síncopes.
- Síndrome de hiperventilación. (Crisis de ansiedad)
- Problemas cardíacos




TIPOS DE SÍNCOPES

- **Vaso vagal (lipotimia)** Más frecuente en mujeres adolescentes.
Síntomas: palidez, sudoración, malestar abdominal, náuseas, visión borrosa o acúfenos o síntomas pre-síncope.
Causas: Miedo, dolor, estrés emocional
- **Ortostático o postural (lipotimia).**
- **Tusígeno.**
- **Miccional.**
- **Hipersensibilidad del seno carotídeo**
- **Cardiogénesis.**



ANTE LOS PRIMEROS SÍNTOMAS

- Colocar el cerebro por debajo del corazón:
 - Levantando los pies o,
 - Colocando la cabeza entre las piernas.
- Maniobras de contrapresión.
- **No intentar levantarlo**



MANIOBRAS DE CONTRAPRESIÓN

Ante indicios de PRE-SÍNCOPES
Colóquese en posición segura: tumbada o sentada y,

- Cruce de piernas con tensión muscular
- Tensión de brazos
- Sentadillas
- Ejercicios isométricos
- Flexión del cuello



ANTE UN SÍNCOPES

- No pierde el conocimiento**
- 5 minutos con piernas levantadas.
 - 5 minutos con piernas bajadas.
 - 5 minutos sentada.
 - ¡Ya pasó!

- Pierde el conocimiento**
- Si respira: Posición lateral **izquierda** de seguridad.



- No respira: PCR y 112
RCP BASICA



LLAMA AL 112, SI:

- Síncopes relacionados con el ejercicio: Educación física o recreo.
- Enfermedad de base: alergias, diabetes.
- Dolor de cabeza.
- Dolor de pecho.
- Movimientos anómalos.
- Pérdida de conciencia prolongada.
- Respiración anormal.

ANTE LA DUDA

LLAMA AL 112

